



# บอกเล่า ข่าวเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวล

กองส่งเสริมการเกษตร

อำเภอพยุหะคีรี จ.พิจิตร โทร ๐๔๓ ๗/๐๖๗/๕๒

ฉบับประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

## การเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร



โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever : ASF) เป็นโรคไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในสุกรที่แพร่กระจาย ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ถึงแม้ว่าโรคนี้จะไม่ใช้โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนแต่ก็ถือว่าเป็นโรคที่สามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเลี้ยงสุกรเป็นอย่างมาก เนื่องจากหากมีการระบาดของโรคนี้ในประเทศแล้วจะกำจัดโรค ได้ยาก เพราะในปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันและควบคุมโรค ในขณะที่เชื้อไวรัสที่ก่อโรคมีความทนทาน ในผลิตภัณฑ์จากสุกรและสิ่งแวดล้อมสูง สุกรที่หายป่วยแล้วจะเป็นพาหะของโรคได้ตลอดชีวิต และยิ่งกว่านั้นโรคนี้เป็นโรค ที่มีความรุนแรงทำให้สุกรที่ติดเชื้อมีการตายเฉียบพลันเกือบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์



## อาการของโรค



ตายเฉียบพลัน มีไข้สูง ผิวน้ำแดง มีจุดเลือดออก หรือรอยช้ำโดยเฉพาะใบหู ท้อง ขาลาย

มีอาการทางระบบอื่น เช่น ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร การแท้งในทุกช่วงของการตั้งท้อง

พบทุกกลุ่มและทุกช่วงอายุ

อัตราป่วย 100% อัตราตาย 30-100% ในลูกสุกร อัตราตายสูง 80-100% ภายใน 14 วัน

## การติดต่อของโรค

การสัมผัสสิ่งคัดหลั่งของสุกรป่วย การหายใจเอาเชื้อเข้าไป การกินอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน การโดนเห็บที่มีเชื้อกัด



เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ที่ปนเปื้อนเชื้อ สามารถแพร่กระจายไวรัสได้

## การระบาดของโรค

๑ ส.ค. ๒๕๖๑ สาธารณรัฐประชาชนจีน พบการระบาดของโรคนี้และมีแนวโน้มแพร่กระจายในวงกว้าง ปัจจุบันในประเทศไทย ยังไม่เคยพบการระบาด



## เมื่อพบเห็นสุกรป่วยตายผิดปกติ/มีอาการตามนิยาม

- ☞ การป้องกัน : เข้มงวดระบบการป้องกันโรค เช่น รู้แหล่งที่มาของสุกร ห้ามคนนอกเข้าฟาร์ม เป็นต้น
- ☞ แจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีเพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือ หรือติดต่อ Call center : ๐๖๓-๒๒๕-๖๘๘๘ หรือแจ้งผ่าน Application DLD ๔.๐ (แจ้งการเกิดโรคระบาด)
- ☞ ห้ามเคลื่อนย้ายสุกรออกจากฟาร์ม